



NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA S.C.
ul. Belgradzka 3/UH9
02-793 Warszawa
Telefon: 22 - 816 83 33
E-mail: lecznica.natolin@gmail.com
Radiologia Cyfrowa DR
Badania i zabiegi endoskopowe

Zwierzę

Max Nr: 011900232

Gatunek: PIES

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samiec

Wiek: 12 lat

Oznakowanie:

Maść: typowa ;)

Właściciel Nr: 011300380

**Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt
-Viva !**

Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

Lekarz prowadzący: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Karta informacyjna wizyty

19/03/2019 20:19: BADANIE

OPIS BADANIA

Badanie kardiologiczne przed zabiegiem.

Bł. śluzowe różowe, wilgotne, osłuchowo szmer sercowy 3/6 w okolicy koniuszka po lewej, szmery oddechowe prawidłowe, tętno zgodne z rytmem serca, dobrze wyczuwalne, ok. 160/min.

BADANIE ECHOKARDIOGRAFICZNE

2D Measurements

LA/Ao(2D)

Śr. LA: 2.08cm Śred. Ao: 1.27cm

LA/Ao: 1.63

M-Mode Measurements

RVDd: 0.80cm

IVSd: 0.66cm LVIDd: 2.43cm

LVPWd: 0.62cm IVSs: 0.97cm

LVIDs: 1.77cm LVPWs: 0.80cm

EDV(Teich): 20.70ml ESV(Teich): 9.27ml

SV(Teich): 11.43ml EF(Teich): 55.2%

FS(Teich): 27.1%

Doppler Measurements

Mitral Valve

MV E Vel: 0.71m/s MV E PG: 2.03mmHg

MV A Vel: 0.86m/s MV A PG: 2.93mmHg

MV E/A: 0.83

MR

MR Vmax: 5.09m/s MR PGmax: 103.46mmHg

Aortic

LVOT Vmax: 1.02m/s LVOT PGmax: 4.19mmHg

TR

TR Vmax: 2.25m/s TR PGmax: 20.28mmHg

Pulmonic Valve

RVOT Vmax: 1.02m/s RVOT PGmax: 4.19mmHg

Opis badania:

Niedomykalność zastawki dwudzielnej znacznego stopnia (fala zwrotna obejmuje ok. 80 % lewego przedsionka). Niewielka niedomykalność zastawki trójdzielnej. Powiększenie lewego przedsionka niewielkiego stopnia. Wielkość pozostałych jam serca prawidłowa, kurczliwość m. sercowego w normie, przepływy przez pozostałe zastawki prawidłowe. Napływ mitralny w fazie wczesnej restrykcji. Funkcja rozkurczowa lekko osłabiona (zmiany wiekowe).

Rozpoznanie:

endokardioza zastawki dwudzielnej i trójdzielnej, ACVIM B2

Zalecenia:

Historia wizyt

Benakor 5 mg 1 x dz. 0,5 tabl. na stałe

Vetmedin/Cardisure 2,5 mg 2 x dz. na 5 dni przed zabiegiem (ostatnia dawka w dniu zabiegu rano), lek podajemy na pusty żołądek (ok. 40 minut przed posiłkiem)

Wskazane badanie kontrolne za ok. 4-5 miesięcy.

Brak przeciwwskazań do znieczulenia ogólnego po ok. 7 dniach od wprowadzenia benazeprilu.

ZABIEGI

Konsultacja kardiologiczna 01-z bad.ECHO

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Podpis lekarza weterynarii