



**Animal Center**  
ul. Zamiany 12  
02-786 Warszawa  
Telefon: 224141812  
E-mail: [biuro@animal-center.pl](mailto:biuro@animal-center.pl)

# ANIMAL CENTER

## Zwierzę

### Kukielka

Gatunek: Kot  
Rasa: Mieszaniec  
Płeć: samica  
Wiek: 7 miesięcy  
Oznakowanie:  
Maść: czarna

## Właściciel

### Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!

Ul. Kawęczyńska 16/39  
03-772 Warszawa

Lekarz prowadzący: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

## Karta informacyjna wizyty

17/04/2019 12:27: BADANIE

### OPIS WYWIADU

Masa ciała 2,5kg

### OPIS BADANIA

W znieczuleniu ogólnym w wykonano zabieg ovariohisterectomii w linii pośrodkowej - jajniki z licznymi ciałkami czerwonymi, znacznie powiększone, rogi i trzon macicy około 7 mm. Założono podwiązki jajników i trzonu macicy Safil 3-0., szwy otrzewnej i mięśni brzucha Safil 3-0, szwy zagłębione Safil 3-0, szew śródskórny Safil 3-0.

### ZABIEGI

O sterylizacji kotki  
Anestezjologia I

### ZASTOSOWANE LEKI

Dexdomitor	0,08	ml
TORBUGESIC / 10 ML INJ.	0,08	1 ml
Bioketan inj. 10ml	0,1	ml
VENFLON 0,9 KD-FIX /NIEBIESKI/ G-22	1	SZT.
Sol 250 ml NaCl	1	szt.
WLEWNIK	1	szt.
Bupivacainum 0,5% na ml!	0,1	szt.
SHOTAPEN ZAW.DO WSTRZ. FLAKON 100 ML	0,25	ml
LOXICOM 5MG	0,1	ml.
Pole chir 75x75	1	szt.
REKAWICE STERYLNE 7 / ANSEL	1	PARA
NiC SAFIL 3-0 OBLA HR 26 90 cm	1	szt.

### ZALECENIA

- DZIŚ - zwierzęciu zapewniamy ciepłe, bezpieczne miejsce, tak aby nie mogło spaść lub zeskoczyć ze względu na możliwe zaburzenia koordynacji po znieczuleniu
- RUCH: przez najbliższy minimum tydzień ruch ograniczamy zakaz w skakania, zeskakiwania
- KARMLENIE: pierwszy posiłek, zmniejszony - proponujemy już około godziny 18 tej
- DOSTĘP DO WODY: zapewniamy po powrocie do domu
- RANĘ POOPERACYJNĄ : zabezpieczamy przed lizaniem, drapaniem lub gryzieniem, w tym celu zakłada się ubranko ochronne
- ZDJĘCIE SZWÓW: po upływie około 10 dni

#### Historia wizyt

- KONTROLA POOPERACYJNA: za 3 dni tj w czwartek u lekarza prowadzącego  
W przypadku jakiegokolwiek wątpliwości, proszę o wcześniejszą wizytę
- LEKI PRZECIBÓLOWE: miejscowo Bupivacainum + Loxicom (do ewentualnej potrzeby)
- ANTYBIOTYKI: Shotapen do ewentualnej potrzeby po 3 dniach na wizycie kontrolnej

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

---

Podpis lekarza weterynarii