

PLAN DZIAŁANIA:

- rozważenie ewentualnego wykonania zabiegu repozycji złamania - tj: ponownego złamania kończyny i prawidłowego ustawienia kości ew z niewielkim skróceniem linii złamania i otworzeniem jam szpikowych (co wiązać się będzie z silnym bólem po zabiegowym i może nieść ze sobą ryzyko wydłużenia się procesu gojenia)
- * przy wyborze takiego rozwiązania konieczne jest wcześniejsze: wykonanie kontrolnych badań krwi (wykonanych u psa niekarmionego minimum 8-12 godzin) profil przesiewowy
- * z wynikami krwi i suczką "zdrową" - bez niepokojących objawów lub bez ciecarki umawiamy się na zabieg na konkretny dzień i godzinę (ustalając termin w rejestracji)
- * przygotowanie opieki dla psa w postaci min : opieki pooperacyjnej - antybiotykoterapia, leki przeciwbólowe, ograniczenia ruchu zwierzęcia (pobyt w klatce ?)

- możliwe jest pozostawienie kończyny do samowygojenia ale w konsekwencji ze świadomością - ^ niewielkiej dysfunkcji ruchu (co związane może być z nieprawidłowym ustawieniem mięśni i nietypowym rozłożeniem sił w osi kończyny oraz wpływem złamania na nie zamknięte w chwili złamania chrząstki wzrostowe,
- ^ skrócenia kończyny (takie skrócenie obciążyć może pozostałe stawy głównie staw łokciowy ale w niewielkim stopniu, nie musi jednak znacząco wpłynąć na motorykę zwierzęcia)
- ^ wiązać się będzie z deformacją kończyny,

ZALECENIA:

- RUCH suczce wciąż ograniczamy ruch (zakaz zabaw z innymi psami, aportów, skoków itp)
- OPATRUNEK zabezpieczamy przed :
 - * ingerencją ze strony zwierzęcia (ew kołnierz)
 - * zamoczeniem (na spacerach zabezpieczamy) w przypadku zsunienia się opatrunku, zmoczenia czy innego uszkodzenia konieczna jest zmiana
 - * kontrolujemy górną okolice opatrunku - szczególnie od str przyśrodkowej pachy (pokazano przy zakładaniu opatrunku) wcześniej niewielkie otarcie skóry od opatrunku ew gdy suczka interesuje się okolicą proszę o kontakt z kliniką, przy podrażnieniu skóry / otarciu naskórka można ranę potraktować Alantanem
- KONTROLNA WIZYTA za około 2 tygodnie tj 26 lub 29tego stycznia - po uprzednim umówieniu się na konkretną godzinę ew w przypadku podjęcia innej decyzji wcześniej
- w przypadku decyzji o pozostawieniu złamania do samogojenia można rozpocząć rehabilitację w postaci codziennych zabiegów pola magnetycznego
- w przypadku decyzji o zabiegu (wykonujemy bad krwi, umawiamy się na zabieg na konkretny dzień) --> w sumie im wcześniej tym lepiej ze względu na wciąż brak pełnego zrostu (trochę mniejsza trauma tkankowa dla pacjenta tj mniejszy ból)

.....
Adnotacja prywatna:

Oceniając stan kliniczny złamania żaden w wyborów nie jest idealny. Nie wykluczone, że podczas zabiegu konieczne może być skrócenie odłamów ze względu na brak możliwości prawidłowego ustawienia osi długiej kości - skrócenie mięśni przy przemieszczeniu odłamów.

Zabiegi

OPATRUNEK - ZMIANA

A Wizyta

Zastosowane leki:

VET FLEX 5cm 1 szt

VET-LITE 15 CM X 1,6 M 0,3 SZT

Kwota: 110,00

Zarejestrował: lek.wet. spec. chirurg Ava Sawaszkiewicz